

Основные тренды первичной заболеваемости наркологическими расстройствами среди детей, подростков и молодежи

Киржанова Валентина Васильевна, зав. отделением эпидемиологии ННЦ наркологии – филиала ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского» Минздрава России

Конференция «Организация здравоохранения. Уроки прошлого и взгляд в будущее»

Круглый стол «Мониторинг потребления ПАВ среди подростков – проблемы и перспективы»

13 – 14 ноября 2019 г.

Основные направления антиалкогольной и антинаркотической политики в России

Законодательные ограничительные меры, направленные на снижение продажи алкогольной продукции и пресечение распространения наркотиков

Универсальная профилактика - направлена на все население, в первую очередь на детей и молодежь

Формирование здорового образа жизни: программы направлены в первую очередь на семью, детей и молодежь

Селективная профилактика направленная на группы риска

Раннее выявление потребителей алкоголя и наркотиков в учебных заведениях

Разработка мер селективной профилактики среди потребителей алкоголя и наркотиков

Модернизация наркологической службы, разработка новых методов лечения и реабилитации

Развитие сети государственных и негосударственных реабилитационных центров, в том числе для детей и подростков

Первичная
обращаемость по
поводу
наркологических
расстройств - *один
из важнейших
показателей,
который
используется в
рамках
мониторинга*

Использованы данные ФСН. Период наблюдения:
1999-2018 гг.


Возрастные группы:

- Дети до 14 лет включительно (дети)
- Дети 15-17 лет включительно (подростки)
- Молодые люди 18-19 лет включительно (молодежь)

Диагностические категории в рамках МКБ-10:

- Алкогольные расстройства, включая алкогольные психозы, синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм), пагубное употребление алкоголя
- Психические расстройства, вызванные употреблением наркотиков, включая синдром зависимости от наркотиков (наркомания), пагубное употребление наркотиков
- Психические расстройства, вызванные употреблением ПАВ, не отнесенных к наркотикам, включая синдром зависимости от ненаркотических ПАВ (токсикомания), пагубное употребление ненаркотических ПАВ

Повозрастные показатели первичной заболеваемости нарколологическими расстройствами (все диагнозы) *(на 100 тыс. населения соотв. возраста)*






Алкогольные расстройства


Дети, подростки и молодежь 18-19 лет
включительно

Динамика структуры алкогольных расстройств у детей, подростков и молодежи (%)




Первичная обращаемость детей, подростков и молодежи по поводу алкогольных расстройств


Подростки и молодежь
(на 100 тыс. нас. соотв. возраста)




Дети до 14 лет
(на 100 тыс. детей 10-14 лет)



Первичная заболеваемость алкоголизмом детей, подростков и молодежи




Первичная заболеваемость алкогольными психозами детей, подростков и молодежи





Обращаемость по поводу пагубного употребления алкоголя у детей, подростков и молодежи

Подростки и молодежь
(на 100 тыс. нас. соотв. возраста)



Дети до 14 лет
(на 100 тыс. детей в возрасте 10-14 лет)







Наркологические расстройства, связанные с употреблением наркотиков

Дети, подростки и молодежь 18-19 лет
включительно

Динамика структуры расстройств, связанных с употреблением наркотиков, у детей, подростков и молодежи (%)




Изменение первичной обращаемости пациентов с наркоманией в зависимости от вида употребляемых наркотиков (%)




Первичная обращаемость детей, подростков и молодежи по поводу психических расстройств, связанных с употреблением наркотиков

Подростки и молодежь
(на 100 тыс. нас. соотв. возраста)




Дети до 14 лет
(на 100 тыс. детей 10-14 лет)




Первичная заболеваемость детей, подростков и молодежи наркоманией


Подростки и молодежь
(на 100 тыс. нас. соотв. возраста)




Дети до 14 лет
(на 100 тыс. детей 10-14 лет)



Первичная обращаемость детей, подростков и молодежи по поводу пагубного употребления наркотиков








Наркологические расстройства, связанные у употреблением ненаркотических ПАВ

Дети, подростки и молодежь 18-19 лет включительно

Динамика структуры расстройств, связанных с употреблением ненаркотических ПАВ, у детей, подростков и молодежи (%)




Первичная обращаемость детей, подростков и молодежи по поводу психических расстройств, связанных с употреблением ненаркотических ПАВ




Первичная заболеваемость детей, подростков и молодежи токсикоманией


Подростки и молодежь
(на 100 тыс. нас. соотв. возраста)



Дети до 14 лет
(на 100 тыс. детей 10-14 лет)



Первичная обращаемость детей, подростков и молодежи по поводу пагубного употребления ненаркотических ПАВ



Резюме

- ❖ Основной тенденцией первичной заболеваемости наркологическими расстройствами среди детей, подростков и молодежи в 1999-2018 гг. является снижение показателей по всем основным группам наркологических расстройств.
 - ✓ В последнее десятилетие в стране проводится работа по первичной профилактике употребления алкоголя и наркотиков среди детей и молодежи, что не могло не оказать своего влияния на снижение первичной обращаемости детского населения и молодежи за наркологической помощью. О снижении распространенности употребления алкоголя и наркотиков в детских и молодежных возрастных группах населения также свидетельствуют социологические и эпидемиологические исследования (ESPAD, 1999-2011; ВОЗ: Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC), 2009/2010 гг. и 2013/2014 гг.; Скворцова Е.С., 2018).
 - ✓ Наблюдается ускорение темпа снижения первичной обращаемости в 2015-2018 гг., что может указывать на влияние организационных факторов. Так, после вступления в действие Порядка оказания наркологической помощи в 2015 г. (Приказ МЗ РФ от 30.12.2015 N 1034н), темпы снижения показателей существенно возросли, как по стране в целом, так и в отдельных ее регионах.
- ❖ В структуре заболеваемости увеличился удельный вес более легкой наркологической патологии – пагубного употребления ПАВ по всех трех диагностических группах, что связано с внедрением профилактических программ, направленных на раннее выявление наркологических расстройств.
- ❖ Изменение паттерна употребляемых наркотиков у пациентов с наркоманией тесно связано с трансформацией предложения на «черном рынке» наркотиков, которая проявляется в увеличении предложения синтетических, новых наркотиков и психостимуляторов.

Изменение уровней первичной заболеваемости алкогольными расстройствами у подростков в субъектах РФ в 2013-2018 гг. (на 100 тыс. подростков 15-17 лет)



Изменение уровней первичной заболеваемости наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, у подростков в 2013-2018 гг.

(на 100 тыс. подростков 15-17 лет)



Изменение уровней первичной заболеваемости наркологическими расстройствами, связанными с употреблением ненаркотических ПАВ, среди подростков 2013 и 2018 гг. (на 100 тыс. подросткового населения)

